

OTIBLOCK[®]

Pediátrico

Gotas para el Oído

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto. Guarde este prospecto, es posible que pueda volver a leerlo. Si necesita información adicional o tiene alguna otra pregunta, consulte a su médico, químico farmacéutico o ingrese a www.fqp.cl. Debe hablar con un especialista si su problema empeora o no mejora dentro de un período de tiempo razonable.

¿Qué es OTIBLOCK[®] pediátrico y para qué debe ser utilizado?

OTIBLOCK[®] pediátrico son gotas para el oído, que ayudan a eliminar la cerilla o cerumen del canal auditivo externo.

OTIBLOCK[®] pediátrico puede utilizarse a partir de los 3 años de edad.

OTIBLOCK[®] pediátrico se presenta en frasco de plástico de 20 ml con gotero.

El ingrediente principal es peróxido de hidrógeno. Esto funciona mediante la liberación de oxígeno, que rompe el cerumen en fragmentos más pequeños que son más fáciles de eliminar. También puede evitar la necesidad de irrigación de oídos. Además del peróxido de hidrógeno, este producto contiene un estabilizador que actúa como un amortiguador para mantener el pH ligeramente ácido, consistente con la fisiología del canal auditivo externo.

La aplicación de OTIBLOCK[®] pediátrico



OTIBLOCK[®] pediátrico se aplica mediante el frasco gotario.

Cuando utilice el producto por primera vez, desprenda la tapa de plástico con fuerza hasta romper el precinto de seguridad. Bajo la tapa, se encuentra integrado el gotero que facilitará la aplicación del producto.

Incline la cabeza hacia un lado y tire suavemente de su oreja hacia atrás.

Coloque con cuidado el aplicador en el canal auditivo externo y aplique las gotas.

Mantenga la cabeza inclinada durante aproximadamente 5 minutos.

Gire su cabeza en dirección opuesta para permitir que el líquido se drene y séquelo suavemente.

Limpie el gotero aplicador por fuera, con cuidado.

Para cada aplicación se recomiendan 10 gotas en el oído afectado.

Aplicar dos veces al día, por un periodo de 3 a 5 días, a no ser que su médico le recomiende una pauta diferente.

En ningún caso cubra o tape los oídos con tapones de algodón u otro material.

Se recomienda tapar bien después de su uso, para una correcta conservación.

No use OTIBLOCK® pediátrico:

- Si es alérgico al peróxido de hidrógeno;
- Si sufre mareos o cualquier tipo de otitis (por ejemplo: dolor, inflamación, secreción);
- Si tiene o sospecha que puede tener, un deterioro del tímpano/ perforado de tímpano; o
- Si sufre de tinnitus y/o tiene un historial de problemas de audición.

Precauciones y posibles efectos secundarios:

OTIBLOCK® pediátrico no interactuará con ningún otro producto o medicamento que pueda estar tomando y/o aplicando. Sin embargo, se aconseja no utilizar el producto en conjunto con otro producto auditivo. No obstante, en caso de que el médico le haya recetado ambos productos, se debe utilizar con una diferencia de 30 minutos, entre el uso de un producto y otro. Se recomienda utilizar OTIBLOCK® pediátrico en primer lugar.

La liberación de oxígeno puede causar una sensación burbujeo temporal. Se ha informado que las soluciones para lo oídos pueden causar molestias, pérdidas de audición, mareos y tinnitus. Estos efectos son transitorios por la presencia de un líquido en el canal auditivo externo. No rellene el contenedor. No utilizar después de la fecha de caducidad que se indica en el etiquetado. Este producto puede manchar la ropa. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua. No ingiera el producto.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Incluso si el frasco no se ha abierto, no lo use después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Mantener por debajo de 30°C.

Composición:

Peróxido de hidrógeno 3%; estabilizante.

Fecha de la última revisión del texto: Marzo 2019.

Para conocer más de Otiblock
contáctenos en:

www.otiblock.com/cl



+56976198298



Mitelos Bioscience S.L. Parc Tecnològic del Vallès
Ronda de Can Fatjó 7-B 08290 Cerdanyola del Vallès.
Barcelona, España. info@mitelos.com

Importado y distribuido en Chile por Droguería
Farmoquímica del Pacífico SpA. Sergio Valdovinos 1455,
Quinta Normal, Santiago - Chile. Bajo Licencia de Mitelos.
www.fqp.cl



Farmoquímica del Pacífico

Mitelos